

## **Троксевазин**

### **Латинское название**

Troxevasin

### **Форма выпуска**

Капсулы

### **Упаковка**

100 шт.

### **Фармакологическое действие**

Троксевазин - ангиопротекторное средство, действует преимущественно на капилляры и вены.

Уменьшает поры между эндотелиальными клетками за счет модификации волокнистого матрикса, расположенного между клетками эндотелия.

Ингибирует агрегацию и увеличивает степень деформируемости эритроцитов; оказывает противовоспалительное действие.

При хронической венозной недостаточности Троксевазин уменьшает выраженность отека, боли, судорог, трофических расстройств, варикозных язв. Облегчает симптомы, связанные с геморроем - боль, зуд и кровотечение.

Благодаря благоприятному воздействию Троксевазина на проницаемость и резистентность стенок капилляров, он способствует замедлению развития диабетической ретинопатии. Кроме того, его влияние на реологические свойства крови способствует предотвращению микротромба сосудов сетчатки.

### **Показания**

- Варикозная болезнь;



- Хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах; чувство тяжести, налитости, усталости ног; сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;
- Тромбофлебит;
- Перифлебит;
- Варикозный дерматит;
- Боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к рутозидам или к другим компонентам препарата.
- Беременность (I триместр).
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит в фазе обострения.

*С осторожностью:* следует применять (длительное применение) при почечной недостаточности.

## **Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано в I триместре беременности и при кормлении грудью, во II и III триместрах беременности можно применять только по назначению врача.

## **Особые указания**

Применение Троксевазина возможно в качестве одного из компонентов комплексного лечения.

## **Состав**

1 капсула содержит:

*Активное вещество:* троксерутин 300 мг;

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, магния стеарат.

## **Способ применения и дозы**

Внутри в начале лечения назначают по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером), при проведении поддерживающей терапии - по 1 капсуле в сутки в течение 3-4 недель и более.

*При ретинопатии* препарат назначают по 1-2 капсуле 3 раза в сутки.

Капсулы следует принимать во время еды.

### **Побочные действия**

*Возможно:* аллергические реакции, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, головная боль.

### **Лекарственное взаимодействие**

Действие усиливается при одновременном приеме аскорбиновой кислоты.

### **Передозировка**

При передозировке возможно появление следующих симптомов: возбуждение, тошнота, головная боль, приливы крови к лицу. При передозировке пациентам необходимо промыть желудок, принять активированный уголь, при необходимости начать симптоматическое лечение.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре от 15° до 25°C.

### **Срок годности**

5 лет.

### **Действующее вещество**

Троксерутин

### **Количество в упаковке**

100

### **Лекарственная форма**

капсулы